Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la côte continentale

Introduction

Les continents

**30 % de la surface
de la Terre**

Reliefs variés

2. Transformations

Thème II: Les continents et leur dynamique

Objectif: Retracer le cycle de la croûte continentale dans le modèle global de la tectonique des plaques.

Chapitre 3 : Dynamique de la croûte continentale.

**Comment la croûte continentale est-elle
produite, transformée puis recyclée?**

Dynamique de la croûte continentale

1. Production

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

Répartition de la sismicité du globe

- Magnitude 7.5 - 8.5
- Magnitude 6.5 - 7.5
- Magnitude 5.5 - 6.5
- Magnitude 4.5 - 5.5

- Depth < 50km
- Depth 50km - 100km
- Depth > 100km

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

1°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

Marge active de subduction

Plaque plongeante

**Plaque
chevauchante**

Alignement séismes-volcanisme-fosse

Un volcanisme explosif : les nuées ardentes

Pinatubo, Philippines.

Un volcanisme explosif : les nuées ardentes

Un volcanisme explosif : les nuées ardentes

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

1°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

2°) Les principales roches magmatiques des zones de subduction.

Des roches plutoniques et des roches volcaniques

Texture grenue

• LA DIORITE

a Un échantillon de diorite

b Lame mince de diorite observée en lumière polarisée analysée

Texture microlithique

• L'ANDÉSITE

a Un échantillon d'andésite

b Lame mince d'andésite observée en lumière polarisée analysée

Texture microlitique

● L'ANDÉSITE

a Un échantillon d'andésite

Verre
volcanique

microlites

b Lame mince d'andésite observée en lumière polarisée analysée

phénocristaux

Modélisation : cristallisation de la vanilline

A température ambiante

Au frigo, 10°C

Au frigo, 5°C

Sur un bloc de glace

Taille des cristaux = f (ΔT)

Des roches plutoniques et des roches volcaniques

**Refroidissement lent,
en profondeur
Roches plutoniques
Texture grenue**

**Refroidissement
brutal, en surface
Roches volcaniques
Texture microlitique**

Les roches magmatiques volcaniques

Diorite et andésite : deux roches de même composition

• LA DIORITE

a Un échantillon de diorite

La diorite

- Roche magmatique plutonique
- Structure grenue
- Composition minéralogique : plagioclases, amphiboles, biotite et muscovite, pyroxènes.

• L'ANDÉSITE

a Un échantillon d'andésite

L'andésite

- Roche magmatique volcanique
- Structure microlitique
- Composition minéralogique :
 - phénocristaux de plagioclases, d'amphiboles, de pyroxènes, de biotite ;
 - microlites d'amphiboles et de plagioclases ;
 - verre (partie non cristallisée).

Granite et rhyolite : deux roches de même composition

a Échantillon de granite

- Roche **magmatique plutonique**
- **Composition minéralogique** : quartz et feldspaths (80 %), micas, éventuellement amphiboles.

Lame mince de granite observée en lumière polarisée analysée

• LA RHYOLITE

a Un échantillon de rhyolite

La rhyolite

- Roche magmatique volcanique
- Structure microlitique
- **Composition minéralogique** :
 - phénocristaux de quartz, d'amphiboles, de feldspath potassique et plagioclases, de biotite ;
 - microlites de quartz et de feldspaths ;
 - verre (partie non cristallisée).

Granodiorite

échantillo

Q = quartz
P = feldspar plagioclase
Bi = biotite
Am = amphibole

Granodiorite

Granitoïdes

• LA DIORITE

a Un échantillon de diorite

Granodiorite

échantillon

x 15

a Échantillon de granite

- Roche **magmatique plutonique**
- **Composition minéralogique** : quartz et feldspaths (80 %), micas, éventuellement amphiboles.

x 10

Lame mince de granite observée en lumière polarisée analysée

Richesse en silice

Granitoïdes riches en minéraux hydroxylés

Composition chimique en oxydes (en %)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO MgO	Na ₂ O K ₂ O	CaO	H ₂ O
Quartz	100	0	0	0	0	0
Orthose	66,67	11,11	0	22,22	0	0
Plagioclases	50,35	33,23	0	4,12	11,67	0
Biotite	35,3	5,88	35,3	11,76	0	11,76
Muscovite	46,1	23,1	0	15,4	0	15,4
Pyroxènes	50	0	50	0	0	0
Amphiboles	50	0	43,75	0	0	1,25

Formules chimiques des principaux minéraux

- Quartz : SiO₂
- Feldspath, orthose : KAlSi₃O₈
- Plagioclases : CaAl₂Si₂O₈ ; NaAlSi₃O₈
- Biotite (mica noir) : K(Fe,Mg)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂
- Muscovite (mica blanc) : KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH)₂
- Pyroxènes : Ca(Fe,Mg)Si₂O₆
- Amphiboles : NaCa₂(Mg,Fe,Al)₅[(Si,Al)₈O₂₂](OH)₂

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

1°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

2°) Les principales roches magmatiques des zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

1°) Conditions de la FP des péridotites mantelliques.

Le diagramme de phase des péridotites mantelliques anhydres

Le diagramme de phase des péridotites mantelliques anhydres

Le diagramme de phase des péridotites mantelliques hydratées

L'état du matériaux est contrôlé par trois variables : P, T et % eau

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

1°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

2°) Les principales roches magmatiques des zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

1°) Conditions de la FP des péridotites mantelliques.

2°) Origine de l'eau nécessaire à la FP des péridotites.

Hydratation de la lithosphère océanique lors de son vieillissement

Légende

- ① Précipitation des minéraux
- ② Recharge : infiltration d'eau de mer
- ③ Décharge : sortie d'eau de mer

La roche de départ : le gabbro océanique

La roche qui subduit : un gabbro du facies Schiste Vert

Gabbro à hornblende

= métagabbro

= gabbro métamorphisé dans le faciès des schistes verts

Aspect macro et microscopique

Plagioclase + Pyroxène + eau →
Amphibole brune de type Hornblende

Plagioclase + Hornblende + eau →
Chlorite + Actinote (Amphibole verte)

Minéraux principaux : Feldspaths plagioclases
et hornblende

La roche qui subduit : un gabbro du facies Schiste Vert

GABRRO FRAIS

METAGABRRO
(à hornblende, chlorite et
actinote) = faciès des Schiste vert

La roche qui subduit : un gabbro du facies Schiste Vert

Hausse de P à T=cste faciès des Schistes Bleus

Formation des métagabbros à glaucophane lors de la subduction

Plagioclase + Chlorite + Actinote → Amphibole bleue (Glaucophane) + eau

déshydratation de la lithosphère océanique au cours de la subduction

température (en °C)

Formation des éclogites lors de la subduction

Plagioclase + Glaucophane → Grenat + Pyroxène vert (Jadéite) + eau

=> Déshydratation de la lithosphère océanique

Libération d'eau

Pression

"Schiste vert"

Act = actinote
Q = quartz
Pl = feldspath plagioclase
Px = pyroxène
J = jadéite (pyroxène vert)
Gl = glaucophane
Gt = grenat

**Métagabbro
à Hornblende**

"Schiste bleu"

Act = actinote
Q = quartz
Pl = feldspath plagioclase
Px = pyroxène
J = jadéite (pyroxène vert)
Gl = glaucophane
Gt = grenat

**Métagabbro
à Glaucophane**

"Eclogite"

**Métagabbro
à Jadéite et Grenat**

Le diagramme de phase des péridotites mantelliques hydratées

Déshydratation de la lithosphère océanique lors de la subduction

Le matériau n'est pas un corps pur : fusion incongruente

Liquide magmatique riche en Si et Al

Péridotite mère

Fusion partielle
plagioclases fondent les premiers

Péridotite solide résiduelle
riche en Fe et Mg

Olivine
(Si, Fe, Mg)

Plagioclases
(Si, Al, Na, Ca)

Pyroxène
(Si, Fe, Mg)

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la coôte continentale

Introduction

1°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

2°) Les principales roches magmatiques des zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

1°) Conditions de la FP des péridotites mantelliques.

2°) Origine de l'eau nécessaire à la FP des péridotites.

3°) Mise en place des roches de la C.C à partir d'un

magma

Les roches magmatiques formées lors de la subduction

1 magma unique mais différentes roches : la Cristallisation Fractionnée

Magma résultant de la fusion
partielle des péridotites
mantelliques

Liquide résiduel de plus en plus
riche en silice

1

olivine

2

pyroxène

3

plagioclase calcique

4

1200°C

600°C

Refroidissement

Contamination

Contaminations
(=échanges d'éléments)

Magma riche en silice = visqueux

Teneur en silice (SiO ₂)	Nature chimique du magma
44 à 50 %	basaltique
54 à 63 %	andésitique
68 à 77 %	rhyolitique

Ordre de grandeur de la viscosité (en poises) de plusieurs types de lave

Accrétion continentale

La subduction : zone de production de roches de la croûte continentale.

La subduction : zone de production de roches de la croûte continentale.

1. Hydratation de la lithosphère océanique

Gabbro

Metagabbro (schiste vert)

granitoïdes

Andésites + rhyolites

4. Ascension du magma => roches plutoniques en profondeur et roches volcaniques en surface

2. Déshydratation de la lithosphère océanique lors de la subduction

Metagabbro (schiste bleu)

Metagabbro (éclogite)

3. Diminution de la température de fusion des péridotites => fusion partielle => formation de magma (100 Km)

2. Transformations

1. Production

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

Déformations de la croûte continentale

Epaisseur de la croûte continentale

ETAT INITIAL

CONSTRAINTES COMPRESSIVES

EPAISSISSEMENT

RACCOURCISSEMENT

Mise en place d'une racine crustale

Transformations pétrographiques

P-T : zones du métamorphisme et de l'anatexis

température (en °C)

400 600 800 1 000 1 200

Argile

la nat

III

6 mm

- solidus du granite
- - - zone du métamorphisme du Limousin

2. Transformations

3. Disparition

1. Production

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

2 types de chaines de montagnes

Paysage du Massif armoricain

Des chaines anciennes

Paysage du Massif central

Des chaines récentes

Paysage des Pyrénées

Relief de la France : il s'agit d'une représentation de partir de données d'altitude du terrain (réalisé par J.-[Technology).

Paysage des Alpes

Les roches à l'affleurement

Roches plutoniques et métamorphiques dans les chaines anciennes

Roches sédimentaires, plutoniques et métamorphiques dans les chaines récentes

Bathymétrie du Moho (=épaisseur de la croûte)

Profondeur du Moho sous les reliefs récents et anciens

Pas de racine crustale dans les chaines anciennes

Existence d'une racine crustale dans les chaines récentes

Comparaison chaîne récente et chaîne ancienne

Chaîne récente

Chaîne récente : les roches sédimentaires sont importantes, les roches formées en profondeur commencent à affleurer. La racine crustale est profonde.

Roches sédimentaires Roches métamorphiques

Chaîne ancienne

Chaîne ancienne : les roches sédimentaires sont érodées, les roches formées en profondeur, granite et gneiss, affleurent.

Roches granitiques Manteau supérieur

- Reliefs élevés
- Affleurement de roches sédimentaires, plutoniques et métamorphiques
- Présence d'une racine crustale

- Reliefs peu importants
- Affleurement de roches plutoniques et métamorphiques
- Pas de racine crustale

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

Temps nécessaire pour aplanir un relief

Évolution de l'altitude d'une chaîne de montagnes en fonction du temps

Erosion

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

a°) altération physique.

Altération physique : alternance gel-dégel

Altération physique : variation de Température

Altération physique : érosion sous les glaciers

Altération physique : action du vent

Altération physique : action des racines

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

a°) altération physique.

b°) altération chimique.

Altération chimique

Hydrolyse

Minéral d'origine + eau $\rightarrow$ nouveau minéral + ions en solution

Muscovite (mica) + eau $\rightarrow$ illite + K⁺

Solubilité des ions en fonction de leur charge et de leur rayon ionique

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

a°) altération physique.

b°) altération chimique.

2°) Transport et sédimentation.

Transport des éléments issus de l'altération

Transport des particules solides dans l'eau

- ① charge déplacée principalement en suspension
- ② charge déplacée par glissement et roulement
- ③ charge chimique en solution

Équilibres transport-dépôt puis compaction

ALTERA
MATÉRI.

vitesse du

Profondeur
(m)

Formation de grès

Grain de sable

Particule argileuse

Eau circulante

argile silt sable gravier galets blocs

Charge sédimentaire de l'Isère

L'Isère en crue en mai 2008

Hauteur érodée par bassin fluvial

Vitesse de dénudation totale (physique et chimique) des continents calculée pour les grands bassins fluviaux

Souvent plus de 300 mm / 1000 ans

Dépôt des produits d'érosion

Image satellitale du delta du Gange

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

2°) Transport et sédimentation.

3°) phénomènes tectoniques accompagnant

l'aplanissement des reliefs.

a°) un réajustement (rebond) isostatique.

Temps nécessaire pour aplanir un relief

altitude (en m)

Combien de fois mille ans ? : $90.000.000 / 1000 = 90.000$

Combien de mm dénudés ?
 $90000 * 300 = 27.000.000$

Soit 27.000 m érodés

Soit 27 km érodés !

Évolution de l'altitude d'une chaîne de montagnes en fonction du temps

Affleurement en surface de granites formés à 15 Km de profondeur

Paysage granitique du mont Lozère

Modèle permettant d'expliquer la remontée des roches plutoniques

Formation de roches plutoniques en profondeur lors de l'orogénèse

exemple : les Alpes

Erosion en surface => allègement de la croûte continentale => remontée de roches mantelliques denses pour compenser ce déficit de masse (réajustement isostatique)

exemple : le Massif central

Poursuite de l'érosion et du réajustement isostatique => affleurement en surface de roches qui se sont formées en profondeur

Temps nécessaire pour aplanir un relief

Évolution de l'altitude d'une chaîne de montagnes en fonction du temps

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

2°) Transport et sédimentation.

3°) phénomènes tectoniques accompagnant

l'aplanissement des reliefs.

a°) un réajustement (rebond) isostatique.

b°) une tectonique en extension qui favorise

l'aplanissement.

Des failles normales dans les Alpes

- Des observations de terrain

Des failles normales découpent les roches dans les Alpes internes

Dans la zone interne des Alpes, il est fréquent d'observer des failles dites normales (traits rouges), comme dans le parc national des Écrins, au niveau de la Tête de La Rochaille et d'Oréac (photographie ci-contre). Ces failles entraînent un affaissement du bloc rocheux situé au-dessus de la faille (toit) : ce type de faille se forme lors d'une extension des terrains.

- Des données sismiques interprétées

Des zones en extension dans les Alpes

- **Données sismotectoniques**

L'étude des relations entre séismes et tectonique (*voir document 1*) permet d'établir les déformations régionales dans les Alpes : les zones en extension sont en bleu, les zones en compression sont en rouge.

Phénomène extensif à la fin de la phase de compression

$$L_2 = 0.01 \times L_1$$

Cas de l'Himalaya : $L_1 = 1000$ km

Petit calcul : $L_2 = 10$ km

La surface centrale d'une chaîne de montagne globalement en compression... est en extension.

La disparition des reliefs

Chaîne de montagnes **récente**

Effondrement de la chaîne

Sédiments et roches sédimentaires issus de l'érosion

Érosion et transport

ranne normale

Croûte continentale

Chevauchement

Granite

Gneiss mignatite

Manteau

Chaîne de montagnes **ancienne**

Roches d'origine profonde à l'affleurement

Manteau

Réajustement isostatique

- Reliefs élevés
- Racine crustale profonde

érosion

- Réajustement isostatique
- Effondrement de la chaîne

- Reliefs faibles
- Absence de racine crustale
- Forte proportion en surface (à l'affleurement) de roches formées et/ou transformées en profondeur

La disparition des reliefs

Chaîne de montagnes récente

- Reliefs élevés
- Racine crustale profonde

- Altération et érosion
- Effondrement de la chaîne
- Réajustement isostatique

Chaîne de montagnes ancienne

- Reliefs faibles
- Absence de racine crustale
- Forte proportion en surface (à l'affleurement) de roches formées et/ou transformées en profondeur

Conclusion

Recyclage des matériaux de la croûte continentale

Magmatisme des zones de subduction

Croûte Continentale :

- Roches sédimentaires
- roches plutoniques et volcaniques
- Roches métamorphiques

Erosion, transport, sédimentation

Roches sédimentaires océaniques

Enfouissement lors de la formation des reliefs

Disparition par subduction

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

A°) Une activité magmatique dans les zones de subduction.

1°) le volcanisme explosif témoin de la formation d'un magma dans les zones de subduction.

2°) Les principales roches magmatiques des zones de subduction.

B°) Origine du magma des zones de subduction.

1°) Conditions de la FP des péridotites mantelliques.

2°) Origine de l'eau nécessaire à la FP des péridotites.

3°) Mise en place des roches de la C.C à partir d'un

magma

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

Thème : Les continents et leur dynamique.

Leçon n°3 : Dynamique de la croûte continentale

Introduction

I°) La production de nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction.

II°) Les transformations subies par la croûte continentale lors de la formation des chaînes de montagnes.

III°) La disparition des reliefs de la croûte continentale.

A°) Deux grands types de chaînes de montagnes.

B°) Les mécanismes permettant l'aplanissement des reliefs.

1°) Altération des roches.

a°) altération physique.

b°) altération chimique.

2°) Transport et sédimentation.

3°) phénomènes tectoniques accompagnant

l'aplanissement des reliefs.

Conclusion