Les plaques lithosphériques.

**Délimitation verticale des plaques
lithosphériques.**

Modèle de la structure interne du globe terrestre

Délimitation de la lithosphère à partir des données sismiques

Caractéristiques des roches au niveau de la LVZ.

Délimitation verticale des plaques tectoniques

Délimitation verticale de la lithosphère

**Délimitation horizontale des plaques
lithosphériques.**

Limites des plaques tectoniques

▲ volcans ● séismes

Limites des plaques tectoniques

**Des plaques lithosphériques mobiles les
unes par rapport aux autres.**

Les dorsales océaniques, zones de divergence

Dorsales

Les dorsales océaniques, zones d'accrétion production de la lithosphère océanique

Les zones de subduction, zones de convergence

Zone de subduction

Les chaînes de montagnes, zones de convergence

Chaînes de montagnes intra continentale

Les chaînes de montagnes, zones de convergence

- sédiments plissés
- croûte continentale déformée
- plutons de granitoïdes
- métamorphisme

Les frontières des plaques lithosphériques

Dorsales

Fosses océaniques

Chaînes de montagnes intra continentale

**Formation de la lithosphère océanique au
niveau des dorsales.**

Une formation de lithosphère océanique au niveau des dorsales

→ 60 000 Km de long

→ 2 000 à 3 000 Km
de large

→ 2 000 m de haut

Les roches de la lithosphère océanique.

Les roches de la lithosphère océanique

Basaltes en pillow-lavas

En 1988, le submersible Alvin, lors d'une mission de la faille transformante de Vema, a permis l'observation de lithosphère océanique.

Basaltes en filons

gabbros

MOHO

Péridotites lithosphériques

Roches caractéristiques de la croûte océanique : basaltes et gabbros

Basalte

Structure **microlitique**

Roche magmatique
volcanique

Gabbro

Structure **grenue**

Roche magmatique
plutonique

Composition des gabbros

Px

Fd

Lame mince de gabbro observée en lumière polarisée analysée

Composition des basaltes

Lame mince de basalte observée en lumière polarisée analysée

Roches caractéristiques du manteau : la péridotite

Les roches de la lithosphère océanique

Les roches de la lithosphère océanique

Rq/: Attention, le manteau n'est pas à l'échelle !

Origine du magma.

Etude de l'état de la péridotite en laboratoire

Fusion partielle des péridotites asthénosphériques au niveau de la dorsale

Diagramme de fusion d'une péridotite obtenu au laboratoire

Augmentation de température

Diminution de la pression

Une remontée de roches profondes chaudes au niveau de la dorsale

Fusion partielle des péridotites asthénosphériques

Remontée de roches profondes chaudes

=> Diminution de pression

=> Fusion partielle des péridotites asthénosphériques

=> une phase liquide (magma) + péridotite résiduelle

**Mise en place des roches de la lithosphère
océanique.**

Roches caractéristiques de la croûte océanique : basaltes et gabbros

Basalte

Structure **microlitique**

Roche magmatique
volcanique

Gabbro

Structure **grenue**

Roche magmatique
plutonique

Modéliser les conditions de refroidissement du magma

Formation des basaltes et des gabbros

Formation des basaltes en 3 temps

Basalte

**Refroidissement très rapide,
au contact de l'eau => verre**

**Refroidissement plus rapide
lors de l'ascension du magma
=> microlites**

**Refroidissement lent en
profondeur => phénocristaux**

Formation de la lithosphère océanique

Formation de basaltes en surface

Pillow-lavas

**Evolution de la lithosphère océanique
après sa formation au niveau de la
dorsale.**

Evolution de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement

Evolution de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement

Hydratation de la lithosphère océanique.

Le métamorphisme hydrothermal

Au niveau d'une dorsale, le volcanisme se caractérise par une remontée de magma et un épanchement de lave dans la partie axiale. La lave, proche de 1200 °C, est refroidie très rapidement dans une eau à 2 °C, ce qui forme des pillow-lavas (basaltes en coussins). De plus, une circulation d'eau de mer se met en place dans les nombreuses failles affectant la lithosphère océanique. Cette circulation hydrothermale participe grandement au refroidissement de la lithosphère océanique.

Doc. 1 Un refroidissement rapide par circulation hydrothermale au voisinage de la dorsale.

Plagioclase + Pyroxène + eau → Hornblende verte

Plagioclase + Hornblende + eau → chlorite + actinote

⇒ **Métagabbro « schiste vert »**

Métamorphisme des péridotites

**Augmentation de la densité de la
lithosphère océanique.**

L'évolution de la lithosphère océanique avec son âge.

$$\left(\frac{1}{3}\right) \times 2,9 + \left(\frac{2}{3}\right) \times 3,36 = 3,2$$

$$(1/4) \times 2,9 + (3/4) \times 3,36 = 3,245$$

Augmentation de la densité de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement

Augmentation de l'épaisseur du manteau lithosphérique, plus dense, au cours du refroidissement de la lithosphère océanique => augmentation de la densité de la LO

La subduction de la lithosphère océanique.

Plaque plongeante

= lithosphère océanique
(vieille et dense)

**Plaque
chevauchante**

= lithosphère continentale
ou lithosphère océanique
(jeune et moins dense)

Métamorphisme des gabbros lors de la subduction

**Métagabbro
« schiste vert »**

**Augmentation de pression (et
de température)**

**=> Métamorphisme
= transformation à
l'état solide**

**Métagabbro =
roche
métamorphique**

Métagabbro du faciès des schiste bleus

Plagioclase + Chlorite + Actinote → Amphibole bleue (Glaucophane) + eau

Métagabbro du faciès des éclogites

Plagioclase + Glaucophane → Grenat + Pyroxène vert (Jadéite) + eau

Métagabbro
« schiste vert »

Métagabbro
« schiste bleu »

Eclogite

Les roches métamorphiques de la subduction

SUBDUCTION

La collision continentale : zone de formation d'une chaîne de montagnes intracontinentale.

Les chaînes de montagnes, zones de convergence

Les chaînes de montagnes, zones de convergence

- sédiments plissés
- croûte continentale déformée
- plutons de granitoïdes
- métamorphisme

Les déformations des roches soumises à des contraintes compressives

pli

Faille inverse

Les déformations subies par les roches suite à des contraintes compressives

Déformations cassantes => failles inverses

Déformations plastiques => plis

Les déformations subies par les roches suite à des contraintes compressives

Mise en place d'une nappe de charriage

Plan de chevauchement

Permien (-280Ma)

Crétacé supérieur tertiaire (-100 à -50Ma)

ETAT INITIAL

CONTRAINTES COMPRESSIVES

EPAISSISSEMENT

RACCOURCISSEMENT